

LES PROPRIETAIRES DE CHIENS SE POSENT SOUVENT CETTE QUESTION :

« A PARTIR DE QUEL AGE VACCINE-T-ON SON
ANIMAL ? »



Jusqu'à l'âge de deux mois, le chiot est protégé par les anticorps contenus dans le lait maternel si la mère a été vaccinée régulièrement.

Il faut donc commencer à le vacciner après cet âge contre les maladies suivantes :

Maladie de Carré
Hépatite de Rubarth
Parvovirose
Leptospirose

Rage dans les pays concernés (et si vous êtes amenés à voyager avec votre chien).

Tout comme chez l'homme, la vaccination assure une protection chez le chien contre les maladies contagieuses les plus graves. Mais attention, elle n'est vraiment efficace que si on respecte bien les dates de rappel.

La Maladie de Carré

Elle est due à un virus très contagieux qui se propage de chien en chien par contact direct et inhalation. Les chiots sont les plus atteints et très peu en réchappent. Les symptômes sont très variés et peu spécifiques : toux et troubles respiratoires, diarrhée, vomissements, fièvre, troubles oculaires, abattement, troubles nerveux, etc. Il est donc important de bien vacciner le chiot et de faire des rappels réguliers.

La Leptospirose

Elle est due à une bactérie - Leptospira - qui contamine de nombreux animaux, surtout des rongeurs (rats) que l'on retrouve en milieux aqueux et chaud (mares, étangs). La contamination se fait par morsure ou simplement par voie cutanée lors d'un contact avec de l'eau souillée (par exemple par de l'urine de rat qui contenait les Leptospira). Les symptômes peuvent varier - ictère, insuffisance rénale, troubles nerveux, hémorragies, abattement - et le diagnostic n'est pas toujours facile. En prévention, il faut donc bien vacciner son chien (en zone infectée, les rappels se font tous les 6 mois).

L'Hépatite de Rubarth

C'est une maladie contagieuse due à un virus. La contamination se fait par contact direct entre chiens ou par l'intermédiaire d'objets souillés. Les symptômes sont une gastro-entérite et une atteinte des ganglions. La protection vaccinale est efficace.

La Parvovirose

C'est une gastro-entérite très contagieuse, mortelle dans sa forme aiguë, due à un virus qui est aussi très résistant dans le milieu extérieur. Les symptômes sont : vomissements, diarrhée hémorragique, fièvre et abattement. La prévention passe par la vaccination.

La Rage

C'est une maladie toujours mortelle chez les animaux et chez l'homme, qui se caractérise par une atteinte du système nerveux. Il n'y a aucun traitement pour une rage déclarée. Il faut donc vacciner préventivement. La vaccination contre la rage est obligatoire pour voyager dans de nombreux pays. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire pour les modalités spécifiques.

La Piroplasmose

C'est une maladie non contagieuse due à un parasite, mais pour laquelle il existe un vaccin. Elle est transmise par les tiques et est mortelle chez le chien sans traitement. Le parasite contamine les globules rouges et on observe les symptômes suivants : abattement, fièvre, urines foncées.

Calendrier de vaccination **(votre vétérinaire adaptera en fonction de votre chien)**

Age du chien	2 à 3 mois	Plus de 3 mois	2 à 4 semaines plus tard	Rappel à 1 an	Rappel à 2 ans
Vaccins	CHP	CHPL (+/- R)	L (+/-R)	CHPL (+/- R)	L (+/-R)